



## Patientinformation

# VEJLEDNING TIL PATIENTER I MARCOUMAR-BEHANDLING

Navn/Cpr.nr: \_\_\_\_\_

Du skal d. \_\_\_\_\_ have lavet en \_\_\_\_\_  
(dato) (undersøgelse)

### **FØR UNDERSØGELSEN:**

- Pause med Marcoumar i 7 dage før undersøgelsen.
- Du skal i stedet have injektion Fragmin, som nedenfor beskrevet:
  - To dage før undersøgelsen (d. \_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_ IE Fragmin x 2 (kl. 8 + 20)
  - Dagen før undersøgelsen (d. \_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_ IE Fragmin x 1 (kl. \_\_\_\_\_)

### **EFTER UNDERSØGELSEN:**

- Du skal opstarte sædvanlig dosis Marcoumar om aftenen på undersøgelsesdagen  
Desuden skal du fortsætte med injektion Fragmin, som nedenfor beskrevet:
  - På undersøgelsesdagen (d. \_\_\_\_\_): 5000 IE Fragmin x 1 (kl. \_\_\_\_\_)
  - Dagen efter undersøgelsen (d. \_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_ IE Fragmin x 1 (kl. 8)
  - Efterfølgende dage (fra d. \_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_ IE Fragmin x \_\_\_\_ (kl. \_\_\_\_\_)
- To dage efter undersøgelsen kan du få målt din INR ved egen læge.
- Du skal fortsætte med både Fragmin og Marcoumarbehandling indtil to dage efter, at din INR er i niveau. Er du i tvivl rådfør dig med egen læge.



## Patientinformation

### VEJLEDNING TIL PATIENTER I MARCOUMAR-BEHANDLING

Hvis du får brug for Fragmin til flere dage, kan du henvende dig her i afdelingen og få ekstra udleveret.

Har du ikke mulighed for selv at tage injektion Fragmin, kan du henvende dig til din lokale hjemmepleje eller lokalcenter, så vil de være behjælpelige.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 78 42 55 11 alle hverdage kl. 9-15.

Med venlig hilsen  
Personalet i Endoskopien, Dagkirurgien.