



Patientinformation

VEJLEDNING TIL PATIENTER I MARCUMAR-BEHANDLING

Navn/Cpr.nr: _____

Du skal d. _____ have lavet en _____
(dato) (undersøgelse)

FØR UNDERSØGELSEN:

- Pause med Marcoumar i 7 dage før undersøgelsen.
- Du skal i stedet have injektion Innohep, som nedenfor beskrevet:
 - To dage før undersøgelsen (d. _____): _____ IE Innohep x 2 (kl. 8 + 20)
 - Dagen før undersøgelsen (d. _____): _____ IE Innohep x 1 (kl. _____)

EFTER UNDERSØGELSEN:

- Du skal opstarte sædvanlig dosis Marcoumar om aftenen på undersøgelsesdagen
Desuden skal du fortsætte med injektion Innohep, som nedenfor beskrevet:
 - På undersøgelsesdagen (d. _____): 4500 IE Innohep x 1 (kl. _____)
 - Dagen efter undersøgelsen (d. _____): _____ IE Innohep x 1 (kl. 8)
 - Efterfølgende dage (fra d. _____): _____ IE Innohep x ____ (kl. _____)
- To dage efter undersøgelsen kan du få målt din INR ved egen læge.
- Du skal fortsætte med både Innohep og Marcoumarbehandling indtil to dage efter, at din INR er i niveau. Er du i tvivl rådfør dig med egen læge.



Patientinformation

VEJLEDNING TIL PATIENTER I MARCOUMAR-BEHANDLING

Hvis du har brug for Innohep til flere dage, kan du henvende dig her i afdelingen og få ekstra udleveret.

Har du ikke mulighed for selv at tage injektion Innohep, kan du henvende dig til din lokale hjemmepleje eller lokalcenter, så vil de være behjælpelige.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 78 42 55 11 alle hverdage kl. 9-15.

Med venlig hilsen
Personalet i Endoskopien, Dagkirurgien.