

Om smerter	Svar
Har jeg smerter efter operationen?	Ja, operationssåret og arvævsdannelse kan give smerter i flere uger efter operationen. Vi hjælper dig med smertestillende medicin. Du får under operationen anlagt en smerteblokade. Dvs. en stor mængde lokalbedøvelse, som giver smertelindrende effekt op til 24 timer efter operationen. Lige efter operationen og de følgende 2 uger får du smertestillende tabletter.
Hvad for noget medicin skal jeg tage efter operationen?	Du skal tage medicin efter skema. Tablet Ibumetin 400 mg x 3 er smertestillende, og det hæmmer samtidig dannelse af ny knogleudvækst og forkalkninger. Tablet Pantoprazol er syreneutraliserende og forebygger mavesår, som kan opstå, når man tager tablet Ibumetin. T. Pinex 1 g x 4 er smertestillende.
Hvordan får jeg recept på medicinen?	Den dag du bliver skrevet op til operationen, laver vi en elektronisk recept på T. Pinex, T. Ibumetin og T. Pantoprazol. Du kan derefter hente medicinen på ethvert apotek.
Hvor længe skal jeg tage medicinen?	Du skal tage medicinen fast i mindst 2 uger efter operationen.
Skal jeg tage smertestillende, hvis jeg ikke har ondt?	Ja, du skal tage Ibumetinen i 2 uger, fordi Ibumetin udover en smertestillende effekt også hæmmer dannelse af ny knogleudvækst.
Er der andet end medicin, der kan afhjælpe smerterne?	Ja. Prøv med ro, is, elevation af benet. Du har måske været for meget i gang!
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke tåler Ibumetin?	Sure opstød, kvalme og halsbrand kan være tegn på, at du ikke kan tåle Ibumetin og straks skal holde op med at tage disse. Hvis du ikke tåler Ibumetin, så aftal med din egen læge, hvilke smertestillende tabletter du skal tage i stedet for Ibumetin.